

平成
29
年度

肺がん検診・ 大腸がん検診・ 胃がん検診を実施します



当組合では、組合員及び加入の家族を対象に、下記要領により郵送によるがん検診を実施いたします。定期的に検査を受けることが早期発見・早期治療の決め手となります。自宅で簡単に受診できますので、ご自身の健康状態を把握するためにもぜひこの機会をご利用ください。

実施要領

対象者

組合員及びその家族
*家族の方は当組合の被保険者に限ります。

検診費用

無料(全額組合負担)

検診項目

① **肺がん検診**：喀痰細胞診
(3日分の喀痰を採取)

② **大腸がん検診**：便検査2日法

③ **胃がん検診**：①・②血液検査
*専用の器具を使い、指先から採血します。
③ 便潜血



下記項目①～③いずれか1つ選択してください。

検査項目	ポイント
① 胃がんリスク	胃がんのリスク・萎縮性胃炎に至るリスク・胃の健康度を知りたい方に推奨
② ペプシノゲン	胃の粘膜の状態(胃の老化度)を知りたい方・胃粘膜の経年変化を知りたい方に推奨
③ 便によるピロリ(便潜血1日)	過去ピロリ菌検査(呼気・血液)が陰性だった方・幼少の方(非浸襲性のため)・ご家族に胃の疾患がなくピロリ菌陰性の可能性が高い世代(39歳以下)の方に推奨

※昨年と実施時期が変更されています。
1月号の実施はありませんのでご注意ください。

申込方法

- ◆ **FAXでお申し込みの方**：別紙の「がん検診申込書」に必要事項を記載し、P29の検査機関にお申し込みください。
- ◆ **郵送でお申し込みの方**：別紙の「がん検診申込書」に必要事項を記載し、その裏面の封筒組立例を参考に組立て、ポストに投函してください。

申込締切日

平成29年10月末日(消印有効)

検体返送締切日

平成29年11月末日(消印有効)

※必ず期日までに検体をご返送ください。

注意 検体返送締切日までに検体を返送されない場合は、自動的にキャンセルされたものとし、器具代+手数料を徴収いたします。


検査結果通知

検査結果は約3週間で個人宛に通知されます。

※異常があった場合には、専門医による精密検査が受けられるよう、適切な指導をいたします。

また、病歴紹介状作成をご希望の方は、下記検査機関にお問い合わせください。

●申し込みから検査結果が届くまで



※受診者の個人情報・検査器具・請求書・検査結果報告書それらにともなう統計・分析などの範囲に限定して使用されます。

検査機関

メスブ細胞検査研究所

- 医療機関紹介
- 紹介状の作成
- 検査へのご質問
- 検査結果へのご質問
- その他

TEL 075-231-2230(平日9:00~17:00)

FAX 075-211-7400

メール mail@msep-kyoto.co.jp

ホームページ http://www.msep-kyoto.co.jp

お気軽にお問い合わせください



毎年受けましょう!
がん検診!

毎年検診を受けることで、重症化を防げます。
若いうちから、元気な時こそ、受診してください!



肺がん検診: 肺がん検診はあなたを肺がんから守ります

アレルギー・PM2.5が気になる人も!

- 胸部レントゲン検査で見つかりにくいタイプのがんに有効です。
- 喀痰細胞診は、中心型早期肺がんの唯一のスクリーニング方法です。

肺門部・中心型肺がん

喫煙者に多い...せき、痰、血痰などの症状



※喀痰検査で発見
肺が脊柱・心臓に隠れるためレントゲンでは見にくい

若い人、女性にも多い

肺野末梢部がん(腺がん)

初期は無症状

※レントゲン検査で発見(喀痰検査でも発見可能)

肺野末梢部がん(扁平上皮がん)

喫煙だけでなく、拡散している煙等を吸うことでも発生
※喀痰検査で発見

近年増加!

◎喀痰検査はハイリスク群に特に有効

- タバコを1日平均20本 30年吸っている人(たくさん吸っている人) 喫煙数600以上
- 6ヶ月以内に血痰のあった人
- 過去に喫煙歴のある人

◎タバコを吸っていない人にも有効です。

- 大気汚染、受動喫煙との関係もあります。
- 治療が必要な肺がん以外の疾患も見つかります。

大腸がん検診：日本の大腸がん死亡率は欧米よりも高い！

大腸ポリープ 粘膜にできる いぼ状の突起物


- 良性の腺腫がほとんど（8～9割）
- 大きくなるとがん化の恐れ
- 予防的に切除する

ポリープからがんが見つかる場合

Japam Polyp Studyの研究結果から

5mm以下	6～9mm	10mm 以上
0.2%	3.1%	31.4%

トランスフェリン
はこの部位に
特に有効です。



早く見つけば、早いほど治りやすい。

- ☆ この30年で罹患数（かかる人）は**6倍！**
- ☆ 2016年予測がんの罹患数**第1位！**
- ☆ がん死亡原因：女性**第1位！** 男性**第3位！**

Point

人間ドックや一般の自治体の検査より
さらに精度の高い検査です！

この検査は1本の採便容器から一般的なヘモグロビンだけでなくトランスフェリンも同時に測定します。深部大腸の病変（ヘモグロビン陰性がん）の発見に有効です。

胃がん検診：ピロリ菌感染は胃がん発生の必要条件です


ABC分類とは？

ヘリコバクター・ピロリ菌の感染の有無を調べるピロリ菌検査と「ペプシノゲン」という物質の血中濃度を測定することで胃粘膜の萎縮（老化）を客観的に調べるペプシノゲン検査で胃の健康度を評価します。

ABC分類		ヘリコバクター・ピロリ抗体価検査	
		陰性	陽性
ペプシノゲン 検査	陰性	A 群	B 群
	陽性	C 群	

- ☆ A群：健康的な胃粘膜
（年間胃がん発生頻度 ほぼ0）
- ☆ B群：胃・十二指腸潰瘍に注意
（年間胃がん発生頻度 1000人に1人）
- ☆ C群：胃がんなどに注意
（年間胃がん発生頻度 80～500人に1人）

胃がん発生の仮説



ピロリ菌に感染すると、胃の粘膜が萎縮し、潰瘍・がんを引き起こします。

ピロリ菌除菌治療に健康保険が使えます！

胃・十二指腸潰瘍に加え、「胃炎」にも健康保険が使えます。ただし、そのためには医師による内視鏡での確認が必須です。

あなたの胃の健康度チェック

- 最近、みぞおちあたりに痛みを感じたことはありませんか？
- 食欲が落ちていませんか？
- 胃のもたれ感が強くなった気がしませんか？
- 吐き気を感じる事がよくありませんか？
- 嗜好品の変化を自覚しませんか？

